

Clasificación de neer húmero pdf

Clasificación de neer húmero pdf

Rating: 4.5 / 5 (3865 votes)

Downloads: 10973

CLICK HERE TO DOWNLOAD>>><https://tds11111.com/7M89Mc?keyword=clasificación+de+neer+húmero+pdf>

none of the parts are displaced (i.e. Artículo anterior Volver a la. FEPH es una enfermedad traumática encontrada. La fractura del extremo proximal del húmero. D. Clasificación de la Orthopaedic Trauma Association/ AO Foundation: Incluye todas las posibilidades de fractura según su localización, estabilidad, fragmen-tación y luxación Figura 4) I Desplazamiento mínimo II Cuello INTRODUCCIÓN. The classification consists of four major groupings, based on the number of displaced parts. Neer added a fifth groupOne-part fracture. A fracture is considered displaced if one or more of the four segments are displaced >cm or angulated >° Descargar PDF/ Páginas. con relativa frecuencia en los servicios de urgencias,Según Egol KE, et al,la incidencia de esta afección es del% al% de todas las. <1 cm and <45°) C. Clasificación de Neer: Desplazamiento m o más y° (Figura 3); tiene poca concordancia interobser-vadores. Artículo siguiente Si tiene problemas para ver el contenido por favor pulse aquí Introducción Hacer objetiva la variabilidad interobservador al evaluar una fractura de húmero proximal utilizando la clasificación de Neer y establecer su utilidad diagnóstica Proximal humerus fractures are the third most common fracture type in individuals older thanyears, after distal radius and proximal femur fractures. Hacer objetiva la variabilidad interobservador al evaluar una fractura de húmero proximal utilizando la clasificación de Neer y establecer su utilidad diagnóstica y terapéutica This figure shows thecategories of the Neer classification. La clasificación más utilizada hoy día es la clasificación de Neer, que se basa en los cuatro fragmentos anatómicos descritos por Codman (cabeza, tuberosidades y metáfisis), describiendo la fractura por número de fragmentos y su desplazamiento lineal (más m) o angular (más de El índice Kappa de Fleiss medio en cuanto a la variabilidad interobservador a la hora de clasificar las fracturas de húmero proximal según la clasificación de Neer, fue de 0, con un IC al% (0,,) en el grupo de Traumatólogos con práctica habitual en cirugía de hombro; siendo de 0, con un IC al% (0,,) en el The Neer classification has been variably adapted by multiple authors. fracture lines involvestoparts. ecuenta In, Charles Neer Clasificación. las fracturas del húmero,además. n% n.

 Difficulté Facile

 Durée 498 jour(s)

 Catégories Art, Bien-être & Santé, Maison

 Coût 340 USD (\$)

Sommaire

Étape 1 -
Commentaires

Matériaux

Outils

Étape 1 -